

## くすりのしおり

620008958

2009年2月作成

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。このために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

### 商品名：アスタット軟膏 1%

主成分：ラノコナゾール（Lanocanazole）

剤形：白色の軟膏剤

シート記載：アスタット軟膏 1% 10g



### この薬の作用と効果について

皮膚糸状菌などの真菌（カビ）の細胞膜成分の生合成を阻害することにより真菌の増殖を抑え、抗真菌作用を示します。

通常、白癬（足白癬、体部白癬、股部白癬）、カンジタ症（間擦疹、指間びらん症、爪囲炎）、癬風（なまぜ）の治療に用いられます。

### 次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・ 以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。
- ・ 妊娠または授乳中
- ・ 他に薬を使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、大衆薬も含めて他に使用中の医薬品に注意してください）。

### 用法・用量（この薬の使い方）

- ・ **あなたの用法・用量は** << >> : 医療担当者記入
- ・ 通常、1日1回患部に塗布します。必ず指示された使用方法に従ってください。
- ・ びらん面（ただれのひどい部位）には使用しないでください。
- ・ 眼科用として角膜、結膜には使用しないでください。眼に入った場合は、すぐ水で洗い医師または薬剤師に相談してください。
- ・ 塗り忘れた場合は、気がついた時にできるだけ早く塗ってください。2回分を一度に塗ってはいけません。
- ・ 誤って多く塗った場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・ 医師の指示なしに、自分の判断で塗るのを止めないでください。

### 生活上の注意

#### この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、接触性皮膚炎、刺激感、発赤、小水疱、かゆみ、亀裂、乾燥、腫脹などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[ ] 内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

該当する記載事項はありません。

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

#### 保管方法その他

- ・ 乳幼児、小児の手の届かないところで、光、高温、湿気を避けて保管してください。
- ・ 薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。

医療担当者記入欄 年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。