

## くすりのしおり

620007747

2010年6月改訂

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。このために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

### 商品名：ファルジーテープ 70mg

主成分：フェルビナク（Felbinac）

剤形：微黄色半透明の貼付剤、10cm×14cm

シート記載：ファルジーテープ 70mg



### この薬の作用と効果について

皮膚から吸収された後、プロスタグランジンといわれる物質の合成を抑え、炎症に伴う腫れや痛みをやわらげます。

通常、変形性関節症、肩関節周囲炎、腱・腱鞘炎、腱周囲炎、上腕骨上顆炎（テニス肘など）、筋肉痛、外傷後の腫脹・疼痛の鎮痛・消炎に用いられます。

### 次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・ 以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。鎮痛剤や解熱剤を飲んで喘息発作をおこしたことがある、気管支喘息がある。
- ・ 妊娠または授乳中
- ・ 他に薬を使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、大衆薬も含めて他に使用中の医薬品に注意してください）。

### 用法・用量（この薬の使い方）

- ・ **あなたの用法・用量は** << >> **：医療担当者記入**
- ・ 通常、1日2回患部に貼ります。必ず指示された使用方法に従ってください。
- ・ 皮膚が傷ついた部位や、粘膜には使用してはいけません。また湿疹または発疹がある部位にも使用してはいけません。
- ・ 貼り忘れた場合は気がついたときに貼ってください。
- ・ 誤って多く貼った場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・ 医師の指示なしに、自分の判断で使用を止めないでください。

### 生活上の注意

#### この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、皮膚炎、そう痒、発赤、接触皮膚炎、刺激感、水疱などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[ ] 内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

該当する記載事項はありません。

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

#### 保管方法その他

- ・ 乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。
- ・ 開封後は、開封口のチャックを合わせて袋を密閉してください。
- ・ 薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。

医療担当者記入欄 年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。