

ネドリール錠125mgを 服用される方へ




このお薬を安全にご使用いただくために
必ずお読みください。

お薬の飲み方

- **1日1回1錠**を食後に、
コップ1杯の水またはぬるま湯といっしょに
飲んでください。



- 飲み忘れた場合は、
気がついた時にその日の分を飲んでください。
絶対に、数日分をまとめて飲んだりしないで
ください。



- お薬は医師の指示に従って正しく服用して
ください。
ご不明な点があれば、医師にお問い合わせせ
ください。

注意

- お薬を服用して腹痛やはきけ、発疹ができる、気分が悪い、全身がだるいなど「何か変だな」と感じたら、医師または薬剤師にご相談ください。



腹痛
はきけ
胃がむかむかする
下痢



発疹ができる
目や皮膚が黄色い




気分が悪い
全身がだるい



頭痛
めまい
眠気

- お薬の飲み合わせによる好ましくない作用を避けるために、他にお薬を飲んでいる方は必ずお知らせください。




- 妊婦または妊娠している可能性のある方、授乳中の方は必ずお知らせください。

- お薬を安全にご使用いただくために、**肝臓や血液の状態を調べる検査を定期的に行う必要があります。**

なにか不安に思うことがあれば、
医師に相談してください。



- お薬は約半年間服用する必要があります。
根気よく治療を続けましょう。



検査日

1回目

年 月 日

2回目

年 月 日

3回目

年 月 日

回目

年 月 日

回目

年 月 日

回目

年 月 日

回目

年 月 日



医療機関名：