

劇薬 処方せん医薬品\*

尋常性乾癬等 角化症治療剤

**オキサロール<sup>®</sup>軟膏25 $\mu$ g/g**

**Oxarol<sup>®</sup> Ointment**


**オキサロール<sup>®</sup>ローション25 $\mu$ g/g**

**Oxarol<sup>®</sup> Lotion**

マキサカルシトール 製剤

※注意—医師等の処方せんにより使用すること

**使用される方へ**



オキサロール<sup>®</sup>軟膏25 $\mu$ g/g

を使用される方へ

オキサロール<sup>®</sup>ローション25 $\mu$ g/g

このお薬を安全かつ適正にご使用いただくために必ずお読みください。

## 使用方法

- 1日2回(場合によっては1回)適量を患部に塗ってください。
- お薬を指先または手のひらに出し、量を確認してから塗ってください。
- 1日の使用量が10gを超えないよう、十分注意してください。

### 1日の使用量

軟膏のみ使用する場合



チューブ1本  
(10g)まで

ローションのみ使用する場合



ボトル1本  
(10g)まで

軟膏とローションの両方を使用する場合

軟膏とローション合わせて10gまで



使用例

軟膏  
4g

ローション  
4g



8g



使用例

軟膏  
8g

ローション  
4g



12g



### 使用量の目安

軟膏



人差し指の  
先から  
第一関節まで  
出した量

=

ローション



1円玉大  
出した量

= 約0.5g

※使用部位、使用回数、使用量は医師の指示に従ってください。


裏面も必ずお読みください。

## 注 意

- 患部以外には使用しないでください。
- お薬にふれた手で眼、粘膜、傷口等にふれないように注意してください。
- お薬を塗り終わったあとは、手をよく洗ってください。
- このお薬の使用により、何か異常を感じた場合は、医師または薬剤師にご相談ください。



- 妊婦または妊娠している可能性のある方、授乳中の方は必ず医師に申し出てください。
- このお薬は、他の人にあげないでください。
- キャップをしめて室温で保管してください。  
(高温、直射日光をさけて保管してください)



- 小児の手の届かない所に保管してください。



マルホ株式会社