

くすりのしおり

620005258

2008年11月改訂

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。このために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

商品名：オキサロールローション 25 μ g/g

主成分：マキサカルシトール（Maxacalcitol）

剤形：白色のローション剤

シート記載：

**この薬の作用と効果について**

活性型ビタミンD₃誘導体で、表皮角化細胞の増殖を抑制し、表皮肥厚を改善する作用があります。通常、乾癬、魚鱗癬、掌蹠角化症、掌蹠膿疱症などの治療に用いられます。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・ 以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。高カルシウム血症およびそのおそれがある、腎機能が低下している。
- ・ 妊娠または授乳中
- ・ 他に薬を使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、大衆薬も含めて他に使用中の医薬品に注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・ **あなたの用法・用量は** ：医療担当者記入 **《 》**
- ・ 通常、1日2回適量を患部にすり込みますが、症状により適宜回数を減らされます。必ず指示された使用方法に従ってください。
- ・ 1日の使用量は10g（オキサロール軟膏と併用する場合も合わせて10g）までです。薬を塗ったあとは手をよく洗ってください。
- ・ 正常な皮膚に使用しないでください。また、眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には水でよく洗い流してください。薬の付いた手で傷口などに触れないようにしてください。
- ・ 塗り忘れた場合は、気がついた時にできるだけ早く塗ってください。絶対に2回分を一度に塗ってはいけません。
- ・ 誤って多く塗った場合および誤って内服した場合は、医師または薬剤師に相談してください。
- ・ 医師の指示なしに、自分の判断で塗るのを止めないでください。

生活上の注意

- ・ 自分では気がつかない副作用を見つけるため、定期的に血中カルシウム値や腎機能検査が行われますので、指示された検査日を守ってください。

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、皮膚刺激、皮膚剥脱、湿疹、紅斑などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[] 内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・ 口渇、倦怠感、脱力感 [高カルシウム血症]
- ・ 尿量減少、むくみ、全身倦怠感 [急性腎不全]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法その他

- ・ 乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。
- ・ 薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。廃棄については受け取った薬局に相談してください。

医療担当者記入欄 年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。