

くすりのしおり

620007779

2009年10月改訂

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。このために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

商品名：ペンステープ 18mg

主成分：リドカイン（Lidocaine）

剤形：白色半透明の貼付剤、30.5mm×50.0mm

シート記載：ペンレス、ND101

**この薬の作用と効果について**

局所麻酔作用により、皮膚に注射針を刺すときの痛みを和らげます。

通常、静脈留置針穿刺時の疼痛緩和に用いられます。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・ 以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。ポルフィリン症
- ・ 妊娠または授乳中
- ・ 他に薬を使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、大衆薬も含めて他に使用中の医薬品に注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・ **あなたの用法・用量は** ：医療担当者記入 **《**
- ・ 通常、1回1枚（主成分として18mg）を注射針を刺す予定の部位に約30分間貼ります。この薬をはがした後、その部位が消毒され、速やかに静脈留置針が刺されます。必ず指示された使用方法に従ってください。
- ・ 湿疹または発疹、傷がある部位や粘膜には貼らないでください。
- ・ 医師の指示なしに、自分の判断で貼るのを止めないでください。

生活上の注意**この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）**

主な副作用として、発赤、かゆみ、接触皮膚炎、刺激感、熱感などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・ 発汗、不快感・めまい、呼吸困難 [ショック、アナフィラキシー様症状]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法その他

- ・ 乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。
- ・ 薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。廃棄については受け取った薬局に相談してください。

医療担当者記入欄 年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。