

喘息治療剤

アストモリジン[®]配合胃溶錠

Asthmolysin[®] M Tab. ※1 注意—習慣性あり ※2 注意—医師等の処方せんにより使用すること

劇薬 向精神薬 習慣性医薬品※1 処方せん医薬品※2

喘息治療剤

アストモリジン[®]配合腸溶錠

Asthmolysin[®] D Tab. ※1 注意—習慣性あり ※2 注意—医師等の処方せんにより使用すること

maruho

* この副作用発現頻度一覧表中に記載されている副作用の他にも副作用・感染症自発報告等に基づくものもございますので、添付文書の「使用上の注意」をご参照ください。

1. 副作用の概要

胃溶錠：総投与症例85例中、2例(2.35%)に副作用が認められ、その症状は口渇1件(1.18%)、腹部膨満感1件(1.18%)、眠気1件(1.18%)であった。また、本剤の投与によると思われる臨床検査値の異常変動はみられなかった。(承認時)

腸溶錠：総投与症例91例中、1例(1.10%)に副作用が認められ、その症状は悪心1件(1.10%)であった。また、本剤の投与によると思われる臨床検査値の異常変動がみられたのは、AST(GOT)の軽度上昇1件(1/47、2.13%)であった。(承認時)

2. 項目別副作用発現頻度及び臨床検査値異常一覧


承認時

調査症例数		配合胃溶錠	配合腸溶錠
		85	91
発現例数(発現率；%)		2 (2.35)	1 (1.10)
発現件数(発現率；%)		3 (3.53)	1 (1.10)
精神神経系	眠気	1 (1.18)	—
	悪心	—	1 (1.10)
消化器	口渇	1 (1.18)	—
	腹部膨満感	1 (1.18)	—
	悪心	—	1 (1.10)
血液生化学検査	AST(GOT)の上昇	—	1 (2.13) 注)

注) 47 症例中 1 例

製品に関するお問い合わせ先：マルホ株式会社 製品情報センター

ひふにやさしい

 0120-122834

フリーダイヤルがご利用いただけない場合 06-6371-8898

受付時間／9:30～17:30 月～金(休日及び当社休業日を除く)

製品情報は弊社ホームページに掲載しております (<http://www.maruho.co.jp/>)