

ブロメライン軟膏5万単位/g

Bromelain Ointment：ブロメライン 軟膏



* この副作用発現頻度一覧表中に記載されている副作用の他にも副作用・感染症自発報告等に基づくものもございますので、添付文書の「使用上の注意」をご参照ください。

1. 副作用の概要

総投与症例203例中、72例(35.47%)に副作用が認められ、主なものは出血52件(25.62%)、疼痛33件(16.26%)、創縁のエロジオン4件(1.97%)等であった。(承認時)


2. 項目別副作用発現頻度及び臨床検査値異常一覧

承認時

総投与症例数	203 例
副作用発現症例数 (発現率；%)	72 例 (35.47%)
副作用発現件数 (発現率；%)	100 件 (49.26%)
出血	52 件 (25.62%)
疼痛	33 件 (16.26%)
創縁のエロジオン	4 件 (1.97%)
傷周囲発赤	3 件 (1.48%)
浮腫	2 件 (0.99%)
紅斑・水疱	2 件 (0.99%)
刺激感	2 件 (0.99%)
そう痒感	1 件 (0.49%)
皮膚炎	1 件 (0.49%)

製品に関するお問い合わせ先：マルホ株式会社 製品情報センター

ひふにやさしい

 **0120-122834**

フリーダイヤルがご利用いただけない場合 06-6371-8898

受付時間／9:30～17:30 月～金（休日及び当社休業日を除く）

製品情報は弊社ホームページに掲載しております（<http://www.maruho.co.jp/>）