

ヒルドイド[®] クリーム0.3%

Hirudoid[®] Cream

ヒルドイド[®] ソフト軟膏0.3%

Hirudoid[®] Soft Ointment

ヒルドイド[®] ローション0.3%

Hirudoid[®] Lotion

ヘパリン類似物質 製剤

maruho

* この副作用発現頻度一覧表中に記載されている副作用の他にも副作用・感染症自発報告等に基づくものもございますので、添付文書の「使用上の注意」をご参照ください。

1. 副作用の概要

●ヒルドイドクリーム0.3%

総投与症例2471例中、23例(0.93%)に副作用が認められ、主なものは皮膚炎9件(0.36%)、そう痒8件(0.32%)、発赤5件(0.20%)、発疹4件(0.16%)、潮紅3件(0.12%)等であった。(効能追加時)

●ヒルドイドソフト軟膏0.3%

総投与症例119例中、本剤による副作用は認められなかった。(承認時)

●ヒルドイドローション0.3%

総投与症例121例中、本剤による副作用は認められなかった。(承認時)

2. 項目別副作用発現頻度及び臨床検査値異常一覧

●ヒルドイドクリーム0.3% (効能追加時)

調査症例数	2471	
発現例数 (発現率)	23 (0.93)	
発現件数 (発現率)	36 (1.30)	
皮膚 (投与部位)	皮膚炎	9 (0.36)
	そう痒	8 (0.32)
	発赤	5 (0.20)
	発疹・丘疹・皮疹	4 (0.16)
	潮紅	3 (0.12)
	湿疹	2 (0.08)
	刺激感	2 (0.08)
	紅斑	1 (0.04)
	分泌物増加	1 (0.04)
	熱感	1 (0.04)

薬剤に起因する臨床検査値の異常変動は認められなかった。

●ヒルドイドソフト軟膏0.3% (承認時)


臨床試験において、副作用及び薬剤に起因する臨床検査値の異常変動は認められなかった。

●ヒルドイドローション0.3% (承認時)

臨床試験において、副作用及び薬剤に起因する臨床検査値の異常変動は認められなかった。

製品に関するお問い合わせ先：マルホ株式会社 製品情報センター

ひふにやさしい

 0120-122834

フリーダイヤルがご利用いただけない場合 06-6371-8898

受付時間／9:30～17:30 月～金 (休日及び当社休業日を除く)

製品情報は弊社ホームページに掲載しております (<http://www.maruho.co.jp/>)