

テルギンGドライシロップ[®]0.1%

Telgin G Dry Syrup：クレマスチンフマル酸塩 ドライシロップ



* この副作用発現頻度一覧表中に記載されている副作用の他にも副作用・感染症自発報告等に基づくものもございますので、添付文書の「使用上の注意」をご参照ください。

1. 副作用の概要

本剤は副作用の内容及び頻度が明確となる調査を実施していない。

<参考>

本剤の市販後の臨床文献を集計した結果、総投与症例684例中45例に副作用が認められ、主なものは眠気30件(4.39%)、倦怠感4件(0.58%)、胃部不快感2件(0.29%)、嘔気2件(0.29%)等であった。

2. 項目別副作用発現頻度及び臨床検査値異常一覧(市販後臨床文献集計)

< 副作用の種類 >

副作用	発生件数	発生率 (%)
眠 気	30	4.39
倦怠感	4	0.58
胃部不快感	2	0.29
嘔 気	2	0.29
胃 痛	1	0.15
食思不振	1	0.15
胸やけ	1	0.15
発 疹	1	0.15
過敏症	1	0.15
疲労感	1	0.15
ふらつき	1	0.15
計	45 件	6.58%

製品に関するお問い合わせ先：マルホ株式会社 製品情報センター

ひふにやさしい

 0120-122834

フリーダイヤルがご利用いただけない場合 06-6371-8898

受付時間／9:30～17:30 月～金（休日及び当社休業日を除く）

製品情報は弊社ホームページに掲載しております (<http://www.maruho.co.jp/>)