

ボアラ[®]軟膏0.12%
クリーム0.12%

Voalla[®]：デキサメタゾン吉草酸エステル 製剤

maruho

* この副作用発現頻度一覧表中に記載されている副作用の他にも副作用・感染症自発報告等に基づくものもございますので、添付文書の「使用上の注意」をご参照ください。

1. 副作用の概要

軟膏：総投与症例 9,840 例中、65 例(0.66%)に副作用が認められ、主なものは毛囊炎・せつ 17 件(0.17%)、ざ瘡様疹 10 件(0.10%)、そう痒感 9 件(0.09%)、刺激感 8 件(0.08%)等であった。(再審査結果)

クリーム：総投与症例 5,157 例中、14 例(0.27%)に副作用が認められ、主なものはざ瘡様疹 3 件(0.06%)、そう痒感 2 件(0.04%)、膿疱 2 件(0.04%)、カンジダ症 2 件(0.04%)等であった。(再審査結果)

2. 項目別副作用発現頻度及び臨床検査値異常一覧

●ボアラ軟膏 0.12%(再審査結果)

調査症例数	9840	
発現例数（発現率；%）	65 (0.66)	
発現件数（発現率；%）	76 (0.77)	
皮膚 (投与部位)	毛囊炎・せつ	17 (0.17)
	ざ瘡様疹	10 (0.10)
	そう痒感	9 (0.09)
	刺激感	8 (0.08)
	発赤	5 (0.05)
	膿疱	3 (0.03)
	接触皮膚炎	3 (0.03)
	紅斑	3 (0.03)
	毛細血管拡張	2 (0.02)
	白癬	2 (0.02)
	皮膚萎縮	2 (0.02)
	カンジダ症	1 (0.01)
	乾燥感	1 (0.01)
	色素沈着	1 (0.01)
	亀裂	1 (0.01)
	真菌感染	1 (0.01)
	潮紅	1 (0.01)
	紅斑性発疹	1 (0.01)
	尋常性ざ瘡	1 (0.01)
	落屑	1 (0.01)
鱗屑	1 (0.01)	
ステロイド皮膚	1 (0.01)	
皮下出血斑	1 (0.01)	

本剤に起因する臨床検査値の異常変動は認められなかった。


●ボアラクリーム 0.12% (再審査結果)

調査症例数	5157	
発現例数 (発現率；%)	14 (0.27)	
発現件数 (発現率；%)	16 (0.31)	
皮膚 (投与部位)	ざ瘡様疹	3 (0.06)
	そう痒感	2 (0.04)
	膿疱	2 (0.04)
	カンジダ症	2 (0.04)
	刺激感	1 (0.02)
	発赤	1 (0.02)
	接触皮膚炎	1 (0.02)
	毛細血管拡張	1 (0.02)
	乾燥感	1 (0.02)
	潮紅	1 (0.02)
ざ瘡	1 (0.02)	

本剤に起因する臨床検査値の異常変動は認められなかった。

製品に関するお問い合わせ先：マルホ株式会社 製品情報センター

ひふにやさしい

 **0120-122834**

フリーダイヤルがご利用いただけない場合 06-6371-8898

受付時間／9:30～17:30 月～金（休日及び当社休業日を除く）

製品情報は弊社ホームページに掲載しております (<http://www.maruho.co.jp/>)