

ヘマンジオル
シロップ小児用0.375%
服用日記



服用前に必ずお読みください。

マルホ株式会社

Pierre Fabre
DERMATOLOGIE
ピエール ファーブル ダーマトロジー (フランス)

この冊子の使い方

- ヘマンジオルシロップの服用上の注意事項を掲載しています。服用を始める前に、必ずお読みください。
- 服用量や服用時間、お子さまの状態を記録できる日記です。お子さまの日々の健康管理にお役立てください。
- 医師又は薬剤師にお子さまの治療経過を伝えるコミュニケーション用ツールとして、医療機関を受診する際には、ぜひこの冊子を持参してください。
- 「服用に関するアクシデント対処法」を収録しています。ぜひお読みください。
- 巻末には、医師又は薬剤師からの説明を書き込めるメモをご用意しています。



かかりつけの医療機関

受診している医療機関の情報をメモしておきましょう。

にゅうじ けっかんしゅ 乳児血管腫の診療医

医療機関名：

担当医師名：

住 所：

電話番号：

かかりつけ医①

医療機関名：

担当医師名：

住 所：

電話番号：

かかりつけ医②

医療機関名：

担当医師名：

住 所：

電話番号：

薬 局

医療機関名：

担当薬剤師名：

住 所：

電話番号：

乳児血管腫以外の病気で通院中又は、何らかのお薬を服用中の場合は、ヘマンジオールシロップの投与を受ける前に医師又は薬剤師にその旨を伝えてください(特に気管支感染症や気管支の異常がある場合)。

ヘマンジオールシロップの服用について

必ず、医師又は薬剤師の指示に従ってください。

詳しい服用方法は、お薬に同梱されている「ヘマンジオールシロップ小児用0.375%使用方法」と、いっしょにお渡しする小冊子「ヘマンジオールシロップ小児用0.375%を服用するお子さまの保護者の方へ」をご確認ください。

服用量

- 受診の際に医師又は薬剤師から指示された用量を必ず守って服用させてください。
- 保護者の方の判断で飲む量や回数を変えることは、絶対にしないでください。
- 飲ませ忘れた場合やお薬を吐き出した場合はその回の服用は中止し、次の服用から再開してください(P.31～32の「服用に関するアクシデント対処法」を併せてよく読んでください)。

服用時間

- 医師又は薬剤師の指示に従い、1日2回、食事中(ほ乳中)又は食後(ほ乳後)すぐに服用させてください。
- お子さまのお腹が空いている状態では服用させないでください。
- 服用間隔は9時間以上あけてください。

服用中の注意点

- 服用中にお子さまに何か異常がみられたり、様子に変化があらわれたりした場合は、すぐに医師又は薬剤師に相談してください。
- お子さまに風邪の症状があるときには、早めに医療機関を受診してください。
- 乳児血管腫以外で医療機関を受診する際は、お子さまがヘマンジオールシロップ(先生によってはこのお薬の成分であるプロプラノロール塩酸塩と伝えたほうが良い場合もあります)を服用中であることを伝えてください。
- 指示された受診日を必ず守ってください。
- 授乳者(母親)が何らかのお薬を服用していて母乳を与える場合、種類によってはお薬が母乳へ移行し、お子さまが服用したヘマンジオールシロップと相互作用を起こして効果が増減したり副作用を増強したりする可能性があります。授乳者がお薬を服用する際には事前に医師又は薬剤師に相談してください。



日記の記入方法・記入例

- 受診時に医師又は薬剤師から指示された1回分の服用量を、
忘れないうちに記入しましょう。
※ ヘマンジオルシロップの服用量は、お子さまの体重と治療期間によって変わっていきますので、
指示された用量を間違えないよう、気を付けてください。
- 1回目と2回目、それぞれ服用した時間を記入しましょう。
- 医療機関を受診したら、医療機関名を記入しましょう。
- ヘマンジオルシロップの他に、処方されたお薬や服用したお薬があれば、
記入しましょう。
- お子さまの健康状態や生活の様子で気になったこと、次の受診日に
医師又は薬剤師に聞きたいことなどをメモに残しておきましょう。
- 1週間単位で、乳児血管腫の患部の様子を記入しましょう。
- 患部の写真を撮っておくのも良いでしょう。
その場合は、撮影日などをメモしておきましょう。



第1週

日付	1回分の 服用量 (mL)	服用した時間 (1日2回服用)		他に服用した お薬など	医療機関の 受診	Memo (お子さまの健康状態や、 気になったこと、 聞きたいこと)
		1回目	2回目			
10/13 (木)	0.9mL	8:45	19:00		〇〇病院	服用開始
10/14 (金)	0.9mL	8:00	18:30			
10/15 (土)	0.9mL	8:45	×			薬を飲み込まず 吐き出してしまった (2回目のとき)
10/16 (日)	0.9mL	8:45	19:00			少し熱があったので 薬を飲み続けても 大丈夫か明日先生に聞く
10/17 (月)	0.9mL	8:00	19:00	解熱剤	〇〇病院	
10/18 (火)	0.9mL	8:30	18:00			
10/19 (水)	0.9mL	8:15	19:00			右腕の血管腫の ところをかいていた

今週の乳児血管腫の様子



第1週

日付	1回分の 服用量 (mL)	服用した時間 (1日2回服用)		他に服用した お薬など	医療機関の 受診	Memo (お子さまの健康状態や、 気になったこと、 聞きたいこと)
		1回目	2回目			
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						

今週の乳児血管腫の様子



第2週

日付	1回分の 服用量 (mL)	服用した時間 (1日2回服用)		他に服用した お薬など	医療機関の 受診	Memo (お子さまの健康状態や、 気になったこと、 聞きたいこと)
		1回目	2回目			
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						

今週の乳児血管腫の様子



第3週

日付	1回分の 服用量 (mL)	服用した時間 (1日2回服用)		他に服用した お薬など	医療機関の 受診	Memo (お子さまの健康状態や、 気になったこと、 聞きたいこと)
		1回目	2回目			
/ ()						
/ ()						
/ ()						
/ ()						
/ ()						
/ ()						
/ ()						

今週の乳児血管腫の様子



第4週

日付	1回分の 服用量 (mL)	服用した時間 (1日2回服用)		他に服用した お薬など	医療機関の 受診	Memo (お子さまの健康状態や、 気になったこと、 聞きたいこと)
		1回目	2回目			
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						

今週の乳児血管腫の様子



第5週

日付	1回分の 服用量 (mL)	服用した時間 (1日2回服用)		他に服用した お薬など	医療機関の 受診	Memo (お子さまの健康状態や、 気になったこと、 聞きたいこと)
		1回目	2回目			
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						

今週の乳児血管腫の様子



第6週

日付	1回分の 服用量 (mL)	服用した時間 (1日2回服用)		他に服用した お薬など	医療機関の 受診	Memo (お子さまの健康状態や、 気になったこと、 聞きたいこと)
		1回目	2回目			
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						

今週の乳児血管腫の様子



第7週

日付	1回分の 服用量 (mL)	服用した時間 (1日2回服用)		他に服用した お薬など	医療機関の 受診	Memo (お子さまの健康状態や、 気になったこと、 聞きたいこと)
		1回目	2回目			
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						

今週の乳児血管腫の様子



第8週

日付	1回分の 服用量 (mL)	服用した時間 (1日2回服用)		他に服用した お薬など	医療機関の 受診	Memo (お子さまの健康状態や、 気になったこと、 聞きたいこと)
		1回目	2回目			
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						

今週の乳児血管腫の様子



第9週

日付	1回分の 服用量 (mL)	服用した時間 (1日2回服用)		他に服用した お薬など	医療機関の 受診	Memo (おさまの健康状態や、 気になったこと、 聞きたいこと)
		1回目	2回目			
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						

今週の乳児血管腫の様子



第10週

日付	1回分の 服用量 (mL)	服用した時間 (1日2回服用)		他に服用した お薬など	医療機関の 受診	Memo (お子さまの健康状態や、 気になったこと、 聞きたいこと)
		1回目	2回目			
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						

今週の乳児血管腫の様子



第11週

日付	1回分の 服用量 (mL)	服用した時間 (1日2回服用)		他に服用した お薬など	医療機関の 受診	Memo (お子さまの健康状態や、 気になったこと、 聞きたいこと)
		1回目	2回目			
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						

今週の乳児血管腫の様子



第12週

日付	1回分の 服用量 (mL)	服用した時間 (1日2回服用)		他に服用した お薬など	医療機関の 受診	Memo (お子さまの健康状態や、 気になったこと、 聞きたいこと)
		1回目	2回目			
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						


今週の乳児血管腫の様子



第13週

日付	1回分の 服用量 (mL)	服用した時間 (1日2回服用)		他に服用した お薬など	医療機関の 受診	Memo (お子さまの健康状態や、 気になったこと、 聞きたいこと)
		1回目	2回目			
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						

今週の乳児血管腫の様子



第14週

日付	1回分の 服用量 (mL)	服用した時間 (1日2回服用)		他に服用した お薬など	医療機関の 受診	Memo (お子さまの健康状態や、 気になったこと、 聞きたいこと)
		1回目	2回目			
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						

今週の乳児血管腫の様子



第15週

日付	1回分の 服用量 (mL)	服用した時間 (1日2回服用)		他に服用した お薬など	医療機関の 受診	Memo (お子さまの健康状態や、 気になったこと、 聞きたいこと)
		1回目	2回目			
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						

今週の乳児血管腫の様子



第16週

日付	1回分の 服用量 (mL)	服用した時間 (1日2回服用)		他に服用した お薬など	医療機関の 受診	Memo (お子さまの健康状態や、 気になったこと、 聞きたいこと)
		1回目	2回目			
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						

今週の乳児血管腫の様子



第17週

日付	1回分の 服用量 (mL)	服用した時間 (1日2回服用)		他に服用した お薬など	医療機関の 受診	Memo (お子さまの健康状態や、 気になったこと、 聞きたいこと)
		1回目	2回目			
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						

今週の乳児血管腫の様子



第18週

日付	1回分の 服用量 (mL)	服用した時間 (1日2回服用)		他に服用した お薬など	医療機関の 受診	Memo (お子さまの健康状態や、 気になったこと、 聞きたいこと)
		1回目	2回目			
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						

今週の乳児血管腫の様子



第19週

日付	1回分の 服用量 (mL)	服用した時間 (1日2回服用)		他に服用した お薬など	医療機関の 受診	Memo (お子さまの健康状態や、 気になったこと、 聞きたいこと)
		1回目	2回目			
/ ()						
/ ()						
/ ()						
/ ()						
/ ()						
/ ()						
/ ()						

今週の乳児血管腫の様子



第20週

日付	1回分の 服用量 (mL)	服用した時間 (1日2回服用)		他に服用した お薬など	医療機関の 受診	Memo (お子さまの健康状態や、 気になったこと、 聞きたいこと)
		1回目	2回目			
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						

今週の乳児血管腫の様子



第21週

日付	1回分の 服用量 (mL)	服用した時間 (1日2回服用)		他に服用した お薬など	医療機関の 受診	Memo (お子さまの健康状態や、 気になったこと、 聞きたいこと)
		1回目	2回目			
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						

今週の乳児血管腫の様子



第22週

日付	1回分の 服用量 (mL)	服用した時間 (1日2回服用)		他に服用した お薬など	医療機関の 受診	Memo (おさまの健康状態や、 気になったこと、 聞きたいこと)
		1回目	2回目			
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						

今週の乳児血管腫の様子



第23週

日付	1回分の 服用量 (mL)	服用した時間 (1日2回服用)		他に服用した お薬など	医療機関の 受診	Memo (お子さまの健康状態や、 気になったこと、 聞きたいこと)
		1回目	2回目			
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						

今週の乳児血管腫の様子



第24週

日付	1回分の 服用量 (mL)	服用した時間 (1日2回服用)		他に服用した お薬など	医療機関の 受診	Memo (お子さまの健康状態や、 気になったこと、 聞きたいこと)
		1回目	2回目			
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						

今週の乳児血管腫の様子



服用に関するアクシデント対処法 「こんな時どうするの？」

Q1. 服用を忘れてしまいました

A1. その回の服用は中止し、
次の服用時まで待ってください

服用忘れに気が付いた時点であわてて飲み忘れた分を飲ませたり、次の服用時に量を増やして飲ませたりすることは絶対にしないでください。

Q2. まちがえて、指示された用量より
多く服用させてしまいました

A2. すぐに医師又は薬剤師に
相談してください

Q3. 決められた時間に食事(ほ乳)が
できませんでした

A3. その回の服用は中止してください

空腹時にヘマンジオールシロップを飲ませると、「蒼白^{そうはく}、発汗、震え、ぐったりする」などの副作用があらわれることがあります。食事(ほ乳)ができれば、服用を再開してください。ただし、再開時には、それまでに飲めなかった分の量を増やして飲ませることは絶対にしないでください。

(例えば、夜にほ乳ができなかった場合は1回分休薬し、次の日の朝のほ乳後に1回分のお薬を飲ませてください。)



Q4. おう吐していますが服用させていいですか

A4. その回の服用は中止してください

胃の中が空っぽの状態になっているので、食事(ほ乳)ができなかったときと同様の副作用があらわれることがあります。おう吐がおさまり、普通に食事(ほ乳)ができるまでに回復したら、次回からの服用を再開することができます。

Q5. お薬を吐き出してしまいました

A5. 次の服用時まで必ず待ってください
お薬を吐き出したり、用量をすべて飲んだかどうか分からないときも、お薬を追加して飲ませないでください

Q6. お薬をなかなか飲んでくれません

A6. ごく少量のミルクや野菜ジュース、ほうじ茶、スポーツドリンクに混ぜて、ほ乳瓶などで飲ませることもできます



服用指導メモ

ヘマンジオルシロップの服用について医師又は薬剤師から受けた説明をメモしましょう。



もしもの時の連絡先

(保護者の方がご記入ください。)

※医療関係者の方へ

下記のお子さまは現在、乳児血管腫の治療のため、

ヘマンジオルシロップ小児用0.375%を服用しています。

(一般名:プロプラノロール塩酸塩)

お子さまのお名前(ふりがな)

生年月日

年 月 日

性別

男 ・ 女

保護者の方のお名前(ふりがな)

住所

緊急連絡先(電話番号など)



医療機関名

ヘマンジオリシロップに関する情報は、ホームページでもご覧いただけます。

乳児血管腫 マルホ

検索

