

ファロムドライシロップ小児用10% 特に注意が必要な副作用

- この薬で最もよくあらわれる副作用は下痢、軟便です。特に3歳未満の乳幼児では、3歳以上よりも下痢、軟便が多くみられます。また、下痢、軟便はこの薬を飲み始めてから3日目までにみられることが多いので、患者さんや保護者の方は、便の状態を十分に観察し、下痢、軟便があらわれた場合には、医師に連絡してください。
- 特にご注意いただきたい副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

自覚症状	副作用
冷汗が出る、体じゅうがかゆい、 皮ふにブツブツができる	ショック、 アナフィラキシー
疲れやすい、目の白い部分が黄 色っぽくなる、皮ふが黄色くな る	<small>かんきのうしょうがい おうだん</small> 肝機能障害、黄疸
尿の量が減る、むくみ	<small>きゅうせいじんしょうがい</small> 急性腎障害
お腹が痛い、 血の混ざったゆるい便が出る	<small>ぎまくせいだいちようえん</small> 偽膜性大腸炎等の血 <small>じゅうとく</small> 便を伴う重篤な大腸 炎



自覚症状	副作用
せき、息がハアハアして苦し くなる	<small>かんしつせいはいえん</small> 間質性肺炎、 <small>しょうこうぐん</small> PIE 症候群
皮ふが広い範囲で赤くなり、 やぶれやすい水ぶくれがた くさんできる、熱が出る、 目が赤くなってただれる	<small>ちゅうどくせいひょうひえしゆうかいしよ</small> 中毒性表皮壊死融解症、 <small>ひふねんまくがんしょうこうぐん</small> 皮膚粘膜眼症候群
急に高い熱が出る、体がゾ クゾクして寒く感じる	<small>むかりゆうきゆうしよ</small> 無顆粒球症
手足のこわばり、 手足のしびれ	<small>おうもんきんゆうかいしよ</small> 横紋筋融解症

本情報は特にご注意いただきたい重大な副作用の早期発見に役立てていただくために、患者向け医薬品ガイドより作成しています。