


# ミチーガ皮下注用60mgシリンジ

## 特に注意が必要な副作用

特にご注意いただきたい副作用と、主な自覚症状を部位別に記載しました。  
副作用であれば、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。  
このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

自覚症状	副作用
ぼんやりしてまわりのことがよく分からなくなる、唇のまわりがはれる	じゅうとく かびんしょう 重篤な過敏症
息がしにくいと感じる	じゅうとく かびんしょう 重篤な過敏症
全身	
熱が出る、体がゾクゾクして寒く感じる	じゅうとく かんせんしょう 重篤な感染症、 じゅうとく かびんしょう 重篤な過敏症
ふらつき、汗をかく	じゅうとく かびんしょう 重篤な過敏症
体が重くて動きたくない感じがする	じゅうとく かんせんしょう 重篤な感染症



### 皮膚

自覚症状	副作用
かゆみ、皮ふにブツブツができる	じゅうとく かびんしょう 重篤な過敏症
体じゅうの皮ふに少し押した程度では破れない大小の水ぶくれ(水疱)がたくさんできる、皮ふにかゆくて赤いブツブツができることがある、たまに粘膜と粘膜がくっついてしまうことがある	るいてんぼうそう 類天疱瘡