


ミチーガ皮下注用30mgバイアル

特に注意が必要な副作用

特にご注意いただきたい副作用と、主な自覚症状を部位別に記載しました。
副作用であれば、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。
このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

自覚症状	副作用
ぼんやりしてまわりのことがよく分からなくなる、唇のまわりがはれる	じゅうとく かびんしょう 重篤な過敏症
息がしにくいと感じる	じゅうとく かびんしょう 重篤な過敏症
全身	
熱が出る、体がゾクゾクして寒く感じる	じゅうとく かんせんしょう 重篤な感染症、 じゅうとく かびんしょう 重篤な過敏症
ふらつき、汗をかく	じゅうとく かびんしょう 重篤な過敏症
体が重くて動きたくない感じがする	じゅうとく かんせんしょう 重篤な感染症



皮膚

自覚症状	副作用
かゆみ、皮ふにブツブツができる	じゅうとく かびんしょう 重篤な過敏症
体じゅうの皮ふに少し押した程度では破れない大小の水ぶくれ(水疱)がたくさんできる、皮ふにかゆくて赤いブツブツができることがある、たまに粘膜と粘膜がくっついてしまうことがある	るいてんぼうそう 類天疱瘡