

ファムビル[®]錠250mg

医薬品リスク管理計画
(RMP)

本資料は医薬品リスク管理計画に基づき作成された資料です

再発性の単純疱疹 (口唇ヘルペス又は性器ヘルペス) に対する治療を受けられる方へ

ファムビル[®]錠250mg

再発性の単純疱疹(口唇ヘルペス又は性器ヘルペス)に対する治療を受けられる方へ

- 以下のような再発の初期症状を感じた場合、再発の初期症状出現後速やかに(6時間以内)お薬を服用してください。

- 痛み(チクチク・ヒリヒリなど)
※ただし性器ヘルペスの排尿時の痛みは含まない。
- むずむずするような違和感
- かゆみ
- 腰の痛みや違和感(性器ヘルペスの場合)

注)上記の例は、再発時に一般的に認められる症状です。

- 医師の指導に従いお薬を服用してください。2回服用するよう指導された場合、2回目の服用は、1回目の服用から12時間程度あけてから服用するようにしてください。12時間後が就寝中となる場合は、6~18時間後の範囲で、就寝前又は起床後に服用してください。1回のみ服用するよう指示された場合は、決して2回目の服用はしないでください。
- 妊娠または妊娠している可能性がある場合、授乳中の場合は、お薬を服用せずに処方医師に相談してください。
- 服用中、服用後に気になる症状があらわれた場合や異常(症状の増悪を含む)を感じた場合は、放置せず、すぐに医師・薬剤師に相談してください。また、再発の初期症状出現後6時間以内にお薬を服用できなかった場合で、治療を希望される方は、医療機関を受診してください。

保管・品質に関する注意点

- このお薬は、白い錠剤ですが、光により淡い黄色等に変色することがあります。お薬は直射日光を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
お薬が変色している場合は、お薬を服用しないでください。
- 使用期限を過ぎたお薬は服用しないでください。

その他、わからないこと、気になることがあれば、
医師・薬剤師にご相談ください。

販 売 **maruho** マルホ株式会社
大阪市北区中津1-5-22