

ファムビル[®]錠250mg

単純疱疹を ファムビル錠 で治療される方へ



監修

愛知医科大学医学部 皮膚科学講座 教授

渡辺 大輔 先生

maruho マルホ株式会社
大阪市北区中津1-5-22

単純ヘルペスをファムビル錠で治療される方へ

単純ヘルペスについて

- 単純ヘルペスは単純ヘルペスウイルスに感染することで皮膚や粘膜などにブツブツや水ぶくれができる病気です。単純ヘルペスウイルスは一度感染すると神経に潜伏し、疲労や日焼けなどが原因となってウイルスが再び活動することで、再発します。
- ブツブツや水ぶくれができる前に、くちびるやその周りなどで感じるピリピリ、ムズムズといった違和感は、ウイルスが再び活動を始めているサインです。
- 違和感が出てきた段階など、早く治療を始めると、ブツブツや水ぶくれができてでも早く治すことができます。

ヘルペスに関する情報はこちら

<https://www.whatsherpes.com/>



ファムビル錠の服用について

- 単純ヘルペスに対するファムビル錠の服用方法は2種類あります(裏面)。
- 妊娠または妊娠している可能性がある場合、授乳中の場合、処方医師に相談してください。
- 服用中、服用後に気になる症状があらわれた場合や異常(症状の増悪を含む)を感じた場合は、放置せず、すぐに医師・薬剤師に相談してください。
- このお薬は白い錠剤ですが、光により淡い黄色等に変色することがあります。お薬は直射日光を避けて室温(1~30°C)で保管してください。お薬が変色している場合は、お薬を服用しないでください。

ファミビル錠の服用方法

① 1回250mg 1日3回投与

- 単純ヘルペスに通常、1回250mg(1錠)を1日3回、原則5日間服用します。
- すでにブツブツや水ぶくれができてしまっている場合や、はじめて単純ヘルペスを発症した場合などはこの服用方法で治療します。



単純ヘルペス発症



医療機関を受診して
お薬を処方してもらう



お薬を5日間
服用する

② 1回1000mg 2回投与(短期間投与)


- 再発性の単純ヘルペスに通常、1回1000mg(4錠)を2回服用します。
- 2回の服用で治療は完結しますが、ピリピリ・ムズムズといった違和感(初期症状)が出てからすぐ(6時間以内)に服用を開始しなければなりません。
- 初期症状が出てすぐに服用を開始するために、再発にそなえてあらかじめ医療機関でお薬を処方してもらうこともできます。
- 再発が頻繁に起こるなど医師が必要性を判断した場合はこの服用方法で治療します。



あらかじめお薬を
処方してもらう



服用後、
早めに医療
機関を受診する



お薬はいつも
携帯しておく



違和感が
でたらすぐに
服用[※]する



※1回目の服用は初期症状を感じて6時間以内、2回目はその12時間後が目安です。2回の服用で治療はおわります。

