

ストロメクトール[®]錠3mg

服用時の注意点

このお薬は疥癬^{かいせん}という皮膚病の原因となるヒゼンダニを駆除する飲み薬です

処方されたお薬は先生の指示通りに服用してください

お薬は必ず空腹時に水で服用してください

お薬の服用1週間後に再度、診察を受けてください

お薬の服用により、体調に異変を感じたら
医師や薬剤師にご相談ください

疥癬治療中の生活の注意点

ふつうの疥癬

- 長時間、肌と肌を接触させないよう注意しましょう
- 衣類や寝具など直接肌に触れるものの共用を避けましょう
長時間の直接的な接触を避けるよう気をつけましょう。

重症の疥癬（角化型疥癬など）

- できるだけ個室を用意し、その中で介護を行いましょう
感染力が非常に強いので注意しましょう。
- 介護を行った個室には殺虫剤の散布を行いましょう
治療開始時と終了時の2回行いましょう。
- 衣類、シーツは毎日交換しましょ
- ベッドマットなどは掃除機で表面を丁寧に掃除しましょ
- 洗濯は50℃以上のお湯に10分間浸してから行いましょ
角化型疥癬では直接的な接触だけでなく、床に落ちた角質層などの間接的な経路から感染します。
- 入浴や掃除は毎日行いましょ
皮膚に垢のようについた角質層はしっかり落としましょ。

